

# Lesiones y tumores benignos de la cavidad bucal, por el Dr. D. Javier Acero, ClínicaMaxilodental Acero, Sevilla

---

Antes que nada espero que estas letras sirvan para tranquilizar a todos aquellos que puedan identificar algún problemilla propio con algunas de las lesiones que comentamos.

1. Aftas bucales; benignas ulceraciones dolorosas en forma de manchas blanquecinas redondas con circulito rojo alrededor ( labio, mejilla, lengua o garganta.)
  - .-CAUSAS: Lesiones, alergias; el cansancio o stress.
  - .-SINTOMAS: Dolor ( 4 a 10 días ). A veces fiebre, inflamación de ganglios del cuello y malestar.
  - .-TRATAMIENTO: Anestésicos tópicos, enjuagues bucales antimicrobianos



2. Herpes oral; originado por el Virus del Herpes simple. Produce **LLAGAS DOLOROSAS** en las encías y mucosas de la boca, a veces fiebre, ganglios inflamados y malestar general. Atención y no confundirlo con trastornos de la dentición en los niños.

En dos o tres días se forman pequeñas vesículas que se rompen fácilmente y son dolorosas.

.-CAUSAS; Quemaduras de sol, resfriados, fiebre, alergia alimentaria, una herida en la boca, tratamiento dental e incluso la ansiedad.

Normalmente aparece una llaga abierta en el labio externo y luego se convierte en costra.

TRTAMIENTO; Atención en los niños si tienen problemas de alimentación y fiebre pues hay peligro de deshidratación. ( beber mucha agua). Para el dolor utilizar enjuagues bucales anestésicos con Lidocaina. Un enueague bucal con Bicarbonato Sódico también puede aliviar.

El Bálsamo de ACICLOVIR puede reducir la intensidad y curar las llagas.

## Lesiones y tumores benignos de la cavidad bucal, por el Dr. D. Javier Acero, ClínicaMaxilodental Acero, Sevilla

---



**CANDIDIASIS ORAL;** Es una infección por hongos que viven en la cavidad oral. Comena en la lengua y dentro de la mejilla y extendiendo a paladar encías, amígdalas y gargana.

Es frecuente en jóvenes, ancianos y personas debilitadas por otra enfermedad. También durante tratamientos con antibióticos prolongados.

**SINTOMAS;** Porciones blancas o enrojecidas protuberantes. Secreción con apariencia de grumos

.Boca seca. Fisuras o agrietamientos en la boca. Dolor al tragar.

**TRATAMIENTO;** Medicación antihongos( antimicóticos) e instrucciones de higiene oral.

Atención en los bebés el uso de tetinas desechables durante la lactancia.

Evitar el uso innecesario de antibióticos y tomar yougurt o tabletas de acidiphilus.

Disminuir el consumo de azúcar y alimentos que contengan levaduras como el pan, vino cerveza.

Si usa inhalador con cortisona, enjuagar mucho la boca después de cada uso.

## Lesiones y tumores benignos de la cavidad bucal, por el Dr. D. Javier Acero, ClínicaMaxilodental Acero, Sevilla

---



**LEUCOPLASIA ORAL.** Mancha blanquecina que se desprende al rasparla. Se desarrolla a partir de una irritación crónica, como superficies asperas en dentaduras postizas, empastes dentales o coronas. Frecuentes en los fumadores de tabaco o personas que se muerden el interior de la mejillas. Pueden convertirse en cancerosas.

**TRATAMIENTO;** Por supuesto abandonar todos los hábitos que puedan producirlo y control por parte del dentista cada tres meses.

Se examinará con biopsia cualquier úlcera que persista mas de dos semanas.

## Lesiones y tumores benignos de la cavidad bucal, por el Dr. D. Javier Acero, ClínicaMaxilodental Acero, Sevilla

---



LIQUEN PLANO; Son papulas blanquecinas que se asemejan a una telaraña, y se consideran de origen autoinmune.

Existen factores de riesgo:

Exposición a colorantes, medicamentos o sustancias químicas.

Infección por el virus de la Hepatitis C

Personas que padecen Lupus Eritematoso.

Injertos de piel.

Es poco frecuente en niños y más en mujeres de mediana edad.

SINTOMAS; Pinceladas blanquecinas que aparecen en mejillas o lados de la lengua o bien en las encías. No suelen dar ni dolor ni picor.

## Lesiones y tumores benignos de la cavidad bucal, por el Dr. D. Javier Acero, ClínicaMaxilodental Acero, Sevilla

---

TRATAMIENTO. No existe aunque pueden mejorar con Vitamina A, esteroides o inmunosupresores.



### TUMORES BENIGNOS DE LA CAVIDA ORAL.

Pasaré solo a mostraros algunas fotos para que podáis identificarlos. Es muy importante que sepáis que cualquier anomalía que suponga alteración de tejidos tanto en aspecto como en volumen en la cavidad bucal, debe desaparecer en máximo 10 días con los tratamientos y hábitos adecuados y si es tumor benigno, con la extirpación por parte del cirujano.

La sintomatología en general viene mas dada por el lugar en que se encuentran. Siendo la boca el órgano de relación mas importante del organismo es pacil comprender que cualquier alteración anatomica que entorpezca nuestras mas importantes funciones era sentida de forma amplificada por cualquier persona.

No quiero extenderme en sintomatología ni especificar nada de cada uno para así evitar los juicios de valor erróneos que cualquiera de vosotros pueda hacer con el consecuente sufrimiento o preocupación, por otro lado gratuito.

Lesiones y tumores benignos de la cavidad bucal, por el Dr. D. Javier Acero, ClínicaMaxilodental Acero, Sevilla

---



Fibroma



Papiloma



angioma



mucoceles.